

## Коротка характеристика препарату

### 1. Назва

Байварол®

### 2. Склад

Одна смужка містить діючу речовину: флуметрин – 3,6 мг.

Допоміжні речовини: поліетилен низької щільності.

### 3. Фармацевтична форма

Щільні білі пластикові смужки.

### 4. Фармакологічні властивості

#### Фармакодинаміка

АТСvet Code: QP53AC05

Флуметрин – синтетичний піретроїд другого типу який, зазвичай, викликає довготривале проникнення натрію у первову мембрану у період збудження. Група альфа-ціано на фрагменті фенокси-фторбензиловому спирту відповідальна за довготривалу проникність натрію. Другий тип піретроїдів продукує отруйни синдром який характеризується хореоатетозом (всього тіла) і слинотечею.

#### Фармакокінетика

Після застосування Байваролу® відбувається постійний вихід флуметрину з поліетиленового матриксу. Флуметрин прикріплюється до бджіл, а потім розповсюджується всередині всієї бджоло сім'ї.

Всмоктування у ссавців мінімальне.

### 5. Клінічні особливості

#### 5.1. Вид тварин

Бджоли.

#### 5.2. Показання до застосування

Для діагностики та контролю флуметрин чутливих *Varroa destructor* у медоносних бджіл.

#### 5.3. Протипоказання

Не застосовувати під час медозбору.

#### 5.4. Побічна дія

Немає.

#### 5.5. Особливі застереження при використанні

Застережень немає.

#### 5.6. Використання під час вагітності, лактації, несучості

Не визначається.

#### 5.7. Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Невідома.

#### 5.8. Дози і способи введення тваринам різного віку

Смужки вішають у вуликах у просторах між рамками в центральній зоні бджололиного гнізда так, щоб бджоли могли переміщатися по ним з обох сторін. Обидві петлі для підвішування відгинають угору в одному напрямку по маркованим лініям згину і вішають смужки на верхню рейку секційної рамки.

Для сильних бджолосімей із нормальним розвитком, які навесні та восени займають 9-10 стандартних рамок, а влітку 20 і більше, застосовують чотири смужки. Слабкі бджолосім'ї, які навесні та восени займають 6 і менше рамок, а влітку менше 20, відводки та молоді робочі бджоли отримують половину дози, тобто дві полоски. Для великих сімей, які займають декілька гніздових корпусів, застосовують чотири смужки на корпус, які розташовують в центрі міжрамкового простору.

Навесні закінчують обробки за два тижні до початку медозбору. Під час медозбору категорично заборонено використання смужок, в кінці літа - після відкачки товарного меду.

Найкращу ефективність Байварол® проявляє при застосуванні в кінці літа після медозбору. Байварол® можна застосовувати у будь-яку пору року для діагностики, а також для лікування вароатозу у випадках інтенсивної інвазії бджолосімей.

Діагностика. Перед підвішуванням смужок дно вулика покривають чистим аркушем паперу. Через 24 години після підвішування смужок дно перевіряють на наявність загиблих кліщів вароа.

Лікування. Тривалість застосування смужок - не більше шести тижнів.

**5.9. Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антитоти)**

Немає.

**5.10. Спеціальні застереження**

Немає.

**5.11. Період виведення (каренції)**

0 днів.

**5.12. Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу**

Не приймати їжу та не палити під час застосування препарату.

Вимити руки після роботи з препаратом.

Запобігайте потраплянню смужок у мед призначений для споживання.

**6. Фармацевтичні особливості**

**6.1. Форми несумісності**

Невідомі.

**6.2. Термін придатності**

5 років.

**6.3. Особливі застереження щодо зберігання**

Зберігати в місцях недоступних для дітей, окремо від продуктів харчування та кормів. Відкривати пакети з фольги безпосередньо перед застосуванням.

Зберігати при температурі не вище 25 ° С.

**6.4. Природа і склад контейнера первинного упакування**

У картонній коробці міститься 5 пакетів з фольги, в кожному пакеті - 4 пластикові смужки.

**6.5. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками**

Використані смужки загорнути у цупкий папір та викинути разом з домашнім сміттям.

**7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення**

Байер Енімал Хелс ГмбХ, D-51368

Bayer Animal Health GmbH, D-51368

Лeverкузен, Німеччина

Leverkusen, Germany

**8. Назва та місцезнаходження виробника**

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,

KVP Pharma + Veterinar-Product, GmbH,

Проенсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль

Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel

Німеччина

Germany

**9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ**

**Байварол®**  
листівка-вкладка

**Опис**

Щільні білі пластикові смужки.

**Склад**

Одна смужка містить діючу речовину: флуметрин – 3,6 мг.

Допоміжні речовини: поліетилен низької щільності.

**Фармакологічні властивості**

**Фармакодинаміка**

АТСvet Code: QR53AC05

Флуметрин – синтетичний піретроїд другого типу який, зазвичай, викликає довготривале проникнення натрію у нервову мембрану у період збудження. Група альфа-ціано на фрагменті фенокси-фторбензилового спирту відповідальна за довготривалу проникність натрію. Другий тип піретроїдів продукує отруйни синдром який характеризується хореоатетозом (всього тіла) і слинотечею.

**Фармакокінетика**

Після застосування Байваролу® відбувається постійний вихід флуметрину з поліетиленового матриксу. Флуметрин прикріплюється до бджіл, а потім розповсюджується всередині всієї бджоло сім'ї.

Всмоктування у ссавців мінімальне.

**Застосування**

Для діагностики та контролю флуметрин чутливих *Varroa destructor* у медоносних бджіл.

**Дозування**

Смужки вішають у вуликах у просторах між рамками в центральній зоні бджолиного гнізда так, щоб бджоли могли переміщатися по ним з обох сторін. Обидві петлі для підвішування відгинають угору в одному напрямку по маркованим лініям згину і вішають смужки на верхню рейку секційної рамки.

Для сильних бджолосімей із нормальним розвитком, які навесні та восени займають 9-10 стандартних рамок, а влітку 20 і більше, застосовують чотири смужки. Слабкі бджолосім'ї, які навесні та восени займають 6 і менше рамок, а влітку менше 20, відводки та молоді робочі бджоли отримують половину дози, тобто дві полоски. Для великих сімей, які займають декілька гніздових корпусів, застосовують чотири смужки на корпус, які розташовують в центрі міжрамкового простору.

Навесні закінчують обробки за два тижні до початку медозбору. Під час медозбору категорично заборонено використання смужок, в кінці літа - після відкачки товарного меду.

Найкращу ефективність Байварол® проявляє при застосуванні в кінці літа після медозбору. Байварол® можна застосовувати у будь-яку пору року для діагностики, а також для лікування вароатозу у випадках інтенсивної інвазії бджолосімей.

Діагностика. Перед підвішуванням смужок дно вулика покривають чистим аркушем паперу. Через 24 години після підвішування смужок дно перевіряють на наявність загиблих кліщів вароа.

Лікування. Тривалість застосування смужок - не більше шести тижнів.

**Протипоказання**

Не застосовувати під час медозбору.

**Застереження**

Дотримуватись вказівок по застосуванню.

**Форма випуску**

У картонній коробці міститься 5 пакетів з фольги, в кожному пакеті - 4 пластикові смужки.

**Зберігання**

Зберігати в місцях недоступних для дітей, окремо від продуктів харчування та кормів. Відкривати пакети з фольги безпосередньо перед застосуванням.

Зберігати при температурі не вище 25 ° С. Термін придатності - 5 років.

**Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення**

Байер Енімал Хелс ГмбХ, D-51368  
Лeverкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH, D-51368  
Leverkusen, Germany

**Назва та місцезнаходження виробника**

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,  
Проєнсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль  
Німеччина

KVP Pharma + Veterinar-Product, GmbH,  
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel  
Germany

